

# Protocolo Osteoartrosis canina (OA)

Librela®  
Bedinvetmab




# Tratamiento de la OA clínica\*

## Primera línea farmacológica según recomendaciones del COAST<sup>1</sup>

**Librela**  
Bedinvetmab


Anticuerpo monoclonal anti-FCN



**OA Leve**




Interrupción probable



**OA Moderada**



Interrupción posible



**OA Severa**



A menudo de por vida

⇒ En cualquiera de los estadios se podrá alargar el tratamiento con Librela® tantos meses como sea necesario acorde a la clínica del animal. (No hay límite de dosis máximas).<sup>2</sup>

⇒ En los casos que se requiera de más poder analgésico por picos de reagudización de la OA, se recomienda el uso de terapias adyuvantes.

## Otras terapias aprobadas para el tratamiento de la OA

**Trocoxil**  
Mavacoxib

**1 comprimido mensual**

2 mg/kg, junto a la comida principal, se repetirá a los 14 días y posteriormente el intervalo de dosificación será de un mes.

**RIMADYL**

**1 administración diaria**

4 mg/kg/día, comprimidos masticables.

⇒ Si utilizamos un AINE, saber que hay respuesta individual a los AINEs, si uno no funciona, hacer periodo de lavado recomendado por el laboratorio y utilizar otro AINE.

\* Trocoxil: Para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados a enfermedad articular degenerativa en perros, en aquellos casos en los que esté indicado un tratamiento continuo que exceda de un mes.

### Referencias:

1. Cachon et al, COAST Development Group's international consensus guidelines for the treatment of canine osteoarthritis. *Frontiers in Veterinary Science*, 3 August 2023. DOI 10.3389/fvets.2023.1137888.

2. Ficha técnica Librela®.

## Primera línea no farmacológica



**Pérdida de peso**



**Modulación del ejercicio**



**Fisioterapia**



**Suplemento articular**

- Omega 3
- Colágeno NO desnaturalizado tipo II

Escanee los QR para acceder a las fichas técnicas. En caso de duda, consulte con su veterinario



Librela®



Trocoxil®



Rimadyl®

**zoetis**